



Dr. Luis Antonio Zúñiga Silva
Enfermedades Alérgicas

Hoja de Control Inmunoterapia Convencional

Paciente		Fecha	
Concentración		Próxima Cita	
Dosis por semana:			

Anote en el recuadro la fecha de la dosis correspondiente

Dosis	Fecha	Dosis	Fecha
.10		.60	
.20		.60	
.30		.60	
.40		.60	
.50		.60	
.60		.60	

Instrucciones

1. Se debe usar jeringa de insulina 1cc con aguja número 26-30G.
2. La cantidad de antígeno que corresponde a cada aplicación debe ser exacta.
3. El sitio recomendado para la vacunación es en la cara posterior del brazo, vía subcutánea, aunque en muslo y abdomen también se puede aplicar.
4. Conserve la vacuna en refrigeración, (no congelada), ni mas de 4 horas a temperatura ambiente.

Precauciones Generales

Durante las primeras 12-24 horas de la vacuna se puede presentar reacción local con enrojecimiento o hinchazón, además de leves síntomas de la enfermedad alérgica del paciente (rinitis, tos, asma), que en general son autolimitados.

En caso de ronchas generalizadas, inflamación de labios, párpados o lengua se deberá notificar al médico tratante o acudir de inmediato a un servicio de urgencias.